

Keglesnit ved hjælp af elektrisk slynge (El-slynge eller loop)

Celleforandringer på livmoderhalsen er en godartet lidelse, som f.eks. kan fjernes ved hjælp af El-slynge.

Forud for indgrebet lægges en lokalbedøvelse i selv livmoderhalsen.

De fleste mærker næsten ingenting herved.

Dernæst fjernes den overfladiske og nederste del af livmoderhalsen ved hjælp af El-slyngen. Det kan lugte brændt, men er ellers uden gener.

Selve indgrebet tager få min (4-8 min).

Bagefter hviler du i klinikken ca ½ time, især for at observere om der kommer blødning fra sårfladen, som er ca. 3 cm i diameter.

Efter behandlingen skal du holde dig i ro samme dag. Sørg for hjemtransport.

Dagene efter indgrebet er der ofte lidt blodigt udflod. Kommer der kraftig blødning, skal skadestuen kontaktes med det samme.

Man vil så evt. kunne lægge noget blødnings standsende gaze op eller på anden vis standse blødning fra sårfladen.

Med hensyn til sygemelding fra arbejde vil det afhænge noget af arbejdets karakter etc.

Undgå at indføre noget i skeden indtil første kontrol ca. 1 måned efter behandlingen.

Mikroskopi svar af det fjernede vævsstykke foreligger ca. 14 dage efter behandlingen.