

NB!!

I meget få tilfælde kan blødningen være så kraftig at der er behov for akut hjælp.

Hvis du har behov for akut hjælp, hvad enten det er pga. meget kraftig blødning eller meget stærke smerter, kan du henvende dig i vores åbningstid alle hverdage kl. 8.00-15.00 på telefon **4268 0432**

Udenfor klinikkens åbningstid:

Ved behov for akut hjælp udenfor vores åbningstid henvises 1813.

Til gennemlæsning inden du har tid hos læge eller sygeplejerske

Christina Damsted Petersen, *Speciallæge i gynækologi, ph.d.*
Klinik for Kvindesygdomme og Seksuel Sundhed, Ølandsgade 2, 2. tv
2300 København S, Tlf: 32545545 kl. 9-12

Du har ønsket at få foretaget *Medicinsk abort*

Inden du bestemmer dig for en abort, bør du læse Komiteen for Sundhedsoplysnings pjece

Abort og Hvornår vil du have børn
(www.sundhedsoplysning.dk)

Hvis du er i tvivl, kan du få hjælp til afklaring ved en støttesamtale hos din egen læge eller anden praktiserende læge efter eget valg, hos Mødrehjælpen, i regionernes familieafdelinger eller i foreningen Sex & Samfunds Præventions- og Rådgivningsklinik i København.

Du kan altid vælge mellem medicinsk og kirurgisk abort

OBS – VIGTIG INFORMATION!!!

Hvis du planlægger eller har planlagt rejse til udlandet indenfor 2 mdr. efter, du har fået foretaget medicinsk abort, skal du kontakte dit rejseforsikringselskab for at sikre dig, du er dækket ved evt. indlæggelse under din rejse.

For at mindske smerterne anbefales det at du tager:

- Ipren 200 mg, 2 tabletter hver 6. time
- Panodil 500 mg, 2 tabletter hver 6. time

Vi anbefaler:

- At du ikke gennemfører aborten alene.
- Ved medicinsk abort sker afstødningen hjemme. Du bør sikre dig, at du har opbakning fra en person som kan hjælpe dig, hvis du behøver hjælp.
- At du bruger bind og ikke tampon
- Samlivet kan genoptages, når du føler dig parat
- At du begynder på prævention lige efter aborten

Fremtidig prævention:

Du kan få oplagt spiral, på den samme henvisning du fik til abort, hvis der ikke er gået mere end 3 måneder.